

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ИССЛЕДОВАНИЮ АНДРОФЛОР

- На исследование может быть направлен соскобный материал (мазок) из уретры или эякулят. Локализацию отбора пробы и биологический материал для исследования определяет лечащий врач.
- При первичной диагностике исследование рекомендуется проводить до начала антибактериальной, противогрибковой или местной терапии.
- Для контроля результатов лечения анализ проводят в сроки, рекомендованные лечащим врачом, но не ранее чем через 1 месяц после завершения курса терапии.

Соскоб (мазок) из уретры

- За 72 часа до исследования:
 - исключить половые контакты или использовать барьерные методы контрацепции (презерватив);
 - не использовать местные антисептические, антибактериальные и противогрибковые средства;
 - не применять инстилляции лекарственных препаратов в уретру.
- Перед взятием соскоба рекомендуется воздержаться от мочеиспускания в течение 1,5-2 часов. По назначению врача этот интервал может быть увеличен.

Эякулят

- За 72 часа до исследования:
 - исключить половые контакты или использовать барьерные методы контрацепции (презерватив);
 - не использовать местные антисептические, антибактериальные и противогрибковые средства.
- Перед сбором материала опорожнить мочевой пузырь в унитаз — это поможет удалить из уретры транзиторную (случайную) микрофлору, которая способна исказить результаты исследования.
- После мочеиспускания тщательно вымыть руки с мылом и провести туалет наружных половых органов с мылом и водой. Головку полового члена и крайнюю плоть высушить стерильной салфеткой.
- Собрать эякулят путем мастурбации в стерильный контейнер.
- Плотнo закрыть крышку, убедиться в герметичности.

Хранение и транспортировка

- Доставить в лабораторию в день сбора материала.
- Хранить и транспортировать при температуре +2+8С.