




Пациент:	№ заявки:
Возраст:	
Пол: М	
Дата взятия:	
Дата выполнения:	Биоматериал: Сыворотка крови
	Метод: непрямая иммунофлюоресценция

Аутоиммунитет

Анализ	Результат	Референсный диапазон			Ед. изм.
		Низкий	Нормальный уровень	Высокий	
Антитела к эндомизию класса IgG (АЭА)	< 5				титр

Отсутствие антител к эндомизию (АЭА) класса IgG снижает вероятность целиакии, при условии, что на момент обследования обследуемый не находился на безглютеновой диете т.е. получал обычную пищу богатую глиадином. Этот тест рекомендуется проводить при подозрении на селективный дефицит IgA, поскольку позволяет исключить целиакию у лиц с селективным иммунодефицитом IgA, у которых целиакия выявляется сравнительно часто.

Врач КДЛ:   Чербаева О.Г.

Одобрено: 29.04.2026

- ▼ - Данный показатель находится в нижней границе нормы, рекомендуем обратить на него внимание.
- ▲ - Данный показатель находится в верхней границе нормы, рекомендуем обратить на него внимание.
- - Данный показатель ниже нормы, рекомендуем обратиться за консультацией к специалисту и вовремя отследить изменения.
- +
- +
- +

Результаты анализов не являются диагнозом, но помогают в его постановке. Не пытайтесь интерпретировать их самостоятельно. Многие изменения индивидуальны, помочь разобраться в них может только специалист.

Результаты, которые отображены в виде числа со знаком <, необходимо расценивать как результат меньше предела количественного обнаружения методики и оборудования на котором выполнялся анализ.