

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ИССЛЕДОВАНИЮ

материала из органов мочеполовой системы

- При первичной диагностике исследование рекомендуется проводить до начала антибактериальной, противогрибковой или местной терапии.
- Для контроля результатов лечения анализ проводят в сроки, рекомендованные лечащим врачом, но не ранее чем через 2 недели после завершения курса терапии.

Подготовка к исследованию для женщин:

- Исследование рекомендуется проводить по окончании периода менструации, начиная с 4–5-го дня менструального цикла. При наличии кровянистых выделений взятие материала не выполняется.
- За 24–48 часов до исследования следует:
 - исключить половые контакты;
 - не применять вагинальные свечи, кремы, гели, таблетки, спермициды и другие местные средства;
 - не проводить спринцевание и влагалищные души;
 - не использовать тампоны;
 - не проводить трансвагинальное УЗИ, кольпоскопию и другие гинекологические инструментальные исследования.
- В день исследования не рекомендуется проводить глубокую интимную гигиену, использовать антисептики, интимные гели, дезодоранты и другие местные средства.
- Если запланировано исследование материала из мочеиспускательного канала (уретры), желательно не мочиться в течение 2–3 часов до взятия соскоба.

Подготовка к исследованию для мужчин:

- За 24–48 часов до исследования следует:
 - исключить половые контакты;
 - не использовать местные антисептические, антибактериальные и противогрибковые средства;
 - не применять инстилляции лекарственных препаратов в уретру.
- Перед взятием соскоба рекомендуется воздержаться от мочеиспускания в течение 2–3 часов. При подозрении на хронический инфекционный процесс или по назначению врача этот интервал может быть увеличен.

Внимание! Инструкция определяет общие правила подготовки пациента. Особые условия указаны на сайте лаборатории в разделе «Подготовка» к отдельным видам исследований.