

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ИССЛЕДОВАНИЯМ

материала из дыхательных путей

- Исследования рекомендуется проводить до начала противовирусной, антибактериальной, противогрибковой или местной терапии.
- Для контроля результатов лечения анализ проводят в сроки, рекомендованные лечащим врачом, но не ранее чем через 2 недели после завершения курса терапии.

Мазок из ротоглотки и носоглотки

- За 12 часов до исследования не рекомендуется использовать лекарственные средства для орошения ротоглотки и препараты для рассасывания.
- Перед проведением исследования не чистить зубы, не использовать жевательную резинку/пастилки для освежения дыхания.
- Перед отбором образца следует прополоскать полость рта водой комнатной температуры и освободить носовые ходы от слизи.

Мокрота

Для сбора мокроты потребуется стерильный контейнер с крышкой (СКК).

- Собрать мокроту на анализ можно только при наличии кашля! Чтобы стимулировать кашель, можно сделать несколько глубоких вдохов. Предпочтительно собрать утреннюю порцию мокроты. Перед сбором мокроты рекомендуется почистить зубы и прополоскать рот кипяченой водой. Не допускайте попадание в мокроту слюны и носовой слизи.
- Мокроту собрать в стерильный контейнер по мере ее откашливания.
- Хранить и транспортировать при температуре +2+8С, доставить в лабораторию в день сбора материала.

Внимание! Инструкция определяет общие правила подготовки пациента. Особые условия указаны на сайте лаборатории в разделе «Подготовка» к отдельным видам исследований.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ИССЛЕДОВАНИЯМ

методом ПЦР

Слюна

- После любых стоматологических манипуляций и процедур перед сбором слюны требуется перерыв не менее 48-72 часов
- Взрослым пациентам следует избегать оральных половых контактов в течение 48 часов перед исследованием
- За 24 часа до исследования необходимо, по возможности, исключить применение в ротоглотке и носоглотке местных лекарственных и парафармацевтических средств.
- За 12 часов до исследования не использовать зубную пасту, не применять ополаскиватели для полости рта, не употреблять жевательную резинку, не осуществлять любые действия, вызывающие кровоточивость десен.
- Пробу отбирают до очередного приема пищи, предпочтительно в утреннее время, или не менее чем через 2 часа после еды.

Сбор биоматериала

Для сбора слюны потребуется стерильный контейнер с крышкой (СКК).

- Перед отбором пробы слюны следует удалить избыток выделений из носа (высморгаться).
- Непосредственно перед отбором пробы необходимо тщательно прополоскать рот и горло кипяченой водой в объеме не менее 200 мл.
- По мере накопления слюны в ротовой полости производить сплевывание в стерильный транспортный контейнер. Объем собранной слюны должен полностью покрывать дно контейнера.
- У маленьких детей возможно отбирать слюну для ПЦР-исследования стерильной одноразовой пастеровской пипеткой или 1-2 мл шприцем без иглы.
- Следует избегать загрязнения слюны слизью из носовых путей, мокротой, кровью. В процессе отбора проб не следует прикасаться к внутренней поверхности крышки и контейнера.
- Тщательно закрыть крышку контейнера, обеспечив герметичность.
- Хранить и транспортировать при температуре +2+8С, доставить в лабораторию в день сбора материала.

Внимание! Инструкция определяет общие правила подготовки пациента. Особые условия указаны на сайте лаборатории в разделе «Подготовка» к отдельным видам исследований.