



Пациент: ОБРАЗЕЦ

№ заявки:

Возраст: 35 л.

Пол: М

Дата взятия:

Дата выполнения:

Биоматериал: Сыворотка крови

Метод: ИФА, ИХЛА



Гормоны крови

Анализ	Результат	Референсный диапазон			Ед. изм.
		Низкий	Нормальный уровень	Высокий	
Тиреотропный гормон (ТТГ)	1,9713	0,3500		4,9400	мкМЕ/мл
Референсные значения для беременных:					
I триместр - 0,1-2,5 мкМЕ/мл					
II триместр - 0,2-3 мкМЕ/мл					
III триместр - 0,3-3 мкМЕ/мл					
Глобулин связывающий половые гормоны (ГСПГ)	56,1	16,2		68,5	нмоль/л
ФСГ	9,9	Мужчины: 0,95-11,95 мМЕ/мл			мМЕ/мл
		Женщины:			
		Фолликулярная фаза - 3,03-8,08 мМЕ/мл			
		Овуляторный пик - 2,55-16,69 мМЕ/мл			
		Лютеиновая фаза - 1,38-5,47 мМЕ/мл			
		Постменопауза - 26,72-133.41 мМЕ/мл			
		Жен (по возрасту):			
		30 дней - 1 год	0,38 мМЕ/мл - 10,40 мМЕ/мл		
		1 - 9 лет	0,42 мМЕ/мл - 5,45 мМЕ/мл		
		9 - 11 лет	0,44 мМЕ/мл - 4,22 мМЕ/мл		
11 - 19 лет	0,26 мМЕ/мл - 7,77 мМЕ/мл				
ЛГ	3,29	Муж (по возрасту):			мМЕ/мл
		30 дней - 1 год	0,09 мМЕ/мл - 2,41 мМЕ/мл		
		1 - 5 лет	0 - 0,91 мМЕ/мл		
		5 - 10 лет	0 - 1,62 мМЕ/мл		
		10 - 13 лет	0,35 мМЕ/мл - 3,91 мМЕ/мл		
		13 - 19 лет	0,78 мМЕ/мл - 5,10 мМЕ/мл		
		Референтные пределы, мМЕ/мл			
		Возраст	Женщины	Мужчины	
		от 4 дней	менее 2,41	0,19-3,81	
		от 3 мес.	менее 1,19	менее 2,89	
от 1 года	менее 0,33	менее 0,33			
от 10 лет	менее 4,34	менее 4,34			
от 13 лет	0,37-6,52	менее 4,11			
от 15 лет	менее 13,08	0,79-4,76			
от 17 лет до 19 лет	менее 8,38	0,94-7,1			
Здоровые мужчины старше 19 лет: 0,57-12,07					
Женщины с нормальным менструальным циклом:					
Фолликулярная фаза: 1,80-11,78					
Середина цикла: 7,59-89,08					
Лютеиновая фаза: 0,56-14,00					
Женщины в постменопаузе, не получающие ЗГТ:					
5,16-61,99					



Пациент: ОБРАЗЕЦ

№ заявки:

Возраст: 35 л.

Пол: М

Дата взятия:

Дата выполнения:

Биоматериал: Сыворотка крови

Метод: ИФА, ИХЛА



Анализ	Результат	Референсный диапазон			Ед. изм.
		Низкий	Нормальный уровень	Высокий	
Пролактин	294,85	72,66		407,40	мМЕ/л
В соответствии с данными Canadian Laboratory Initiative on Pediatric Reference Interval Database (Clinical Biochemistry 42 (2009)) 885-891 уровень пролактина у девочек-подростков 15-20 лет может колебаться в значительных пределах: 88,8 - 2498,63 мМЕ/л. При получении высоких значений пролактина рекомендуется консультация эндокринолога.					
Тестостерон свободный	0,5993	0,2188		0,7708	нмоль/л
Тестостерон общий	+ 35,062	8,330		30,190	нмоль/л
Рекомендации Европейской ассоциации урологов (EAU) и (ISSAM) по диагностике гипогонадизма у мужчин: более 12 нмоль/л - нормальный уровень тестостерона; 8-12 нмоль/л - рекомендовано определение свободного тестостерона; менее 8 нмоль/л - сниженный уровень тестостерона					
Индекс свободных андрогенов	62,5	24,5		113,3	%

Врач КДЛ: _____

Одобрено: ДАТА ОДОБРЕНИЯ

Система управления и менеджмента качества лаборатории сертифицирована по стандартам ГОСТ Р ИСО 15189.

Лаборатория регулярно проходит внешнюю оценку качества клинических лабораторных исследований по отечественным (ФСВОК) и международным (RIQAS, RfB, ERNDIM) программам. ООО «ХромсистемсЛаб» является членом ассоциации "Федерация Лабораторной Медицины", сотрудники ООО «ХромсистемсЛаб» входят в состав комитета по хроматографическим методам исследований и хромато-масс-спектрометрии.

Лицензия: Л041-01137-77/00368418 от 23.09.2020 г.



- ▼ - Данный показатель находится в нижней границе нормы, рекомендуем обратить на него внимание.
- ▲ - Данный показатель находится в верхней границе нормы, рекомендуем обратить на него внимание.
- - Данный показатель ниже нормы, рекомендуем обратиться за консультацией к специалисту и вовремя отследить изменения.
- +** - Данный показатель выше нормы, рекомендуем обратиться за консультацией к специалисту и вовремя отследить изменения.

Результаты анализов не являются диагнозом, но помогают в его постановке. Не пытайтесь интерпретировать их самостоятельно. Многие изменения индивидуальны, помочь разобраться в них может только специалист.

Результаты, которые отображены в виде числа со знаком <, необходимо расценивать как результат меньше предела количественного обнаружения методики и оборудования на котором выполнялся анализ.