


Пациент
Дата рождения
Пол Ж
Возраст
Вес 47 kg
Рост 1.50 m
ИМТ 20.9 kg/m ²

Биомаркеры
Дата сдачи анализов 2026-01-31
Альфа2 Макроглобулин 2.29 g/l
Гаптоглобин 1.08 g/l
Аполипопротеин A1 1.71 g/l
Билирубин 8 µmol/l
Гамма ГТ 16 IU/l
АЛТ 41 IU/l
АСТ 23 IU/l
Уровень глюкозы натощак 5.2 mmol/l
Общий холестерин 5.06 mmol/l
Триглицериды 0.72 mmol/l

Результаты тестов



Предосторожности по использованию и интерпретации тестов


Соблюдение рекомендуемых компанией BioPredictive условий до и во время проведения анализов является основой получения достоверных результатов. Тесты не применяются при остром гемолизе, остром гепатите, острых воспалительных заболеваниях, внепеченочном холестазах. Посоветуйтесь со специалистом при интерпретации теста в случае хронического гемолиза или синдрома Жильбера. Интерпретируемость тестов не была апробирована для пациентов с трансплантированной печенью. Будьте внимательны при интерпретации результатов в случае выхода за нормальные значения какого-либо из показателей. В случае несоответствия между результатом биопсии и тестом рекомендуется проконсультироваться с врачом специалистом. Причины этих несоответствий могут быть связаны с дефектом теста или дефектом биопсии: то есть биопсия печени имеет частоту вариабельности 35% для одной стадии фиброза. АЛТ может недооцениваться у лиц с дефицитом витамина B6. Это не влияет на оценку. FibroTest проводится при хронических гепатитах B и C, алкогольном и неалкогольном стеатозе. ActiTest проводится при хронических гепатитах B и C. SteatoTest проводится при хронических гепатитах B и C, алкогольном и неалкогольном стеатозе. NashTest проводится при неалкогольном стеатогепатите. AshTest проводится при алкогольном стеатогепатите.




Как интерпретировать результаты теста ?

В данном руководстве по интерпретации представлены тесты компании BioPredictive по диагностике основных заболеваний печени

Использованные в руководстве значения являются условными и носят объяснительный характер. Результат, полученный при подсчете Вашего теста, представлен на отдельной странице.




FibroTest
оценивает рубцы на печени (фиброз)




FibroTest оценивает наличие фиброза (рубца) в печени

- ▶ F0 : отсутствие фиброза
- ▶ F1 : минимальный фиброз
- ▶ F2 : умеренный фиброз
- ▶ F3 : прогрессирующий фиброз
- ▶ F4 : выраженный фиброз (цирроз)

Фиброз: замещение соединительной тканью структур печени, возникшей в результате воспалительного процесса в ней в результате воздействия вируса, накопления жира либо алкоголя. Фиброз часто сравнивают со шрамом в печени.


SteatoTest 2
оценивает жировую перегрузку (стеатоз или жировая печень)




SteatoTest 2 оценивает стеатоз печени :

- ▶ S0 : стеатоз отсутствует (<5%)
- ▶ S1 : минимальный стеатоз (клинически значимого) (5-33%)
- ▶ S2S3 : от среднего до тяжелого стеатоза (клинически значимого) (34-100%)

Стеатоз: накопление жира в печени, вызванное метаболическими аномалиями (холестерин, триглицериды, сахарный диабет, лишний вес). Стеатоз обычно называют жировой печенью.


ActiTest
оценивает деятельность (воспаление при хроническом вирусном гепатите С или В)




ActiTest диагностирует степень активности воспаления :

- ▶ A0 : активность отсутствует
- ▶ A1 : минимальная активность
- ▶ A2 : умеренная активность
- ▶ A3 : высокая активность

Активность процесса - воспалительные изменения в печени, наблюдаемые при хронических гепатитах В и С.


NashTest 2
оценивает воспаление (при болезнях обмена веществ: диабете, избыточном весе, холестерине, триглицеридах)




NashTest 2 Оценивает степень НАСГ :

- ▶ N0 : отсутствует НАСГ
- ▶ N1 : минимальный НАСГ
- ▶ N2 : умеренный НАСГ
- ▶ N3 : выраженный НАСГ

НАСГ: воспаление печени, связанное со стеатозом (жировая печень). НАСГ - реакция организма на накопление жира в печени.


AshTest
Оценивает воспаление печени (при чрезмерном употреблении алкоголя)



AshTest это тест, который оценивает воспаление вызванное употреблением алкоголя :

- ▶ H0 : отсутствие воспаления
- ▶ H1 : умеренное воспаление
- ▶ H2 : значительное воспаление
- ▶ H3 : острое воспаление

Действие: оценивает степень воспаления (при чрезмерном употреблении алкоголя).