



Пациент:	№ заявки:	
Возраст:		
Пол:		
Дата взятия:		
Дата выполнения:	Биоматериал: Сыворотка крови	
	Метод: ИФА	

Комплексное обследование на паразитарные инвазии (13 параметров)

Показатель	Значение	Нормы
Антитела Ig G к лейшмании Leishmania spp.(ИФА)	2,79 UE	<9,0 - отрицат., 9,0 -10,9-сомнит.(рекоменд. Повтор.анализа через 2-3 нед), > 11,0 - положит.
Антитела (IgA, IgM, IgG) к лямблиям Lamblia spp. (ИФА)	1:100 титр	Титр 1:100 -- отр., 1:200 - 1:400 -- сомнит.(рекомендуется повтор.анализа через 2-3нед.) > 1:400-- положит.
Антитела IgG к аскаридам Ascaris lumbricoides (ИФА)	3,23 UE	<9,0 - отрицат., 9,0 -10,9-сомнит.(рекоменд. Повтор.анализа через 2-3 нед), > 11,0 - положит.
Антитела IgG к кошачьей двуустке Opistorchis felineus (ИФА)	1,57 UE	<9,0 - отрицат, 9,0 - 10,0 -- сомнит,(рекомендуется повтор.анализа через 2-3 нед) > 11,0 -- положит.
Антитела IgG к свиному цепню Taenia solium (ИФА)	1,73 UE	<9,0- отрицат., 9,0 - 10,9-сомнит.(рекоменд. Повтор.анализа через 2-3 нед), > 11,0 -- положит.
Антитела IgG к токсокарам Toxocara canis (ИФА)	2,91 UE	<9,0-отрицат., 9,0 - 10,9 - сомнит(рекоменд.повтор.ана лиза через 2-3 нед.), > 11,0 -- положит.

примечание	Нормы указаны согласно полу и возрасту
------------	--

Врач КДЛ: _____

ответственный исполнитель	
---------------------------	--



Пациент:	№ заявки:	
Возраст:		
Пол:		
Дата взятия:		
Дата выполнения:	Биоматериал: Сыворотка крови	
	Метод: ИФА	

Комплексное обследование на паразитарные инвазии (13 параметров)

Показатель	Значение	Нормы
Антитела IgG к трихинеллам Trichinella spiralis (ИФА)	1,59 UE	<9,0- отрицат., 9,0 - 10,9- сомнит. (рекоменд.повтор.анализа через 2-3 нед), > 11,0 -- положит.
Антитела IgG к эхинококку Echinococcus granulosus (ИФА)	1,67 UE	<9,0-отрицат., 9,0 - 10,9-сомнит(рекоменд.повтор.анализа через 2-3 нед.), > 11,0 -- положит.
Антитела IgG к бруцелле	0,039 ОП	< 0,200 -- отриц., 0,200 - 0,300 -- сомнит., >0,300 -- положит.
Ig G к возбудителю шистосоматоза Schistosoma mansoni (ИФА)	2,58 UE	<9,0-отрицат., 9,0 - 10,9-сомнит(рекоменд.повтор.анализа через 2-3 нед.), > 11,0 -- положит.
Ig G к стронгилоидозу Strongiloides (ИФА)	3,83 UE	<9,0 - отрицат., 9,0 -10,9-сомнит.(рекоменд. Повтор.анализа через 2-3 нед), > 11,0 - положит.
Ig G к возбудителю амебиоза Entamoeba histolytica (ИФА)	4,28 UE	<9,0 - отрицат., 9,0 -10,9-сомнит.(рекоменд. Повтор.анализа через 2-3 нед), > 11,0 - положит.

примечание	Нормы указаны согласно полу и возрасту
------------	--

Врач КДЛ: _____

ответственный исполнитель	
---------------------------	--



Пациент:	№ заявки:	
Возраст:		
Пол:		
Дата взятия:		
Дата выполнения:	Биоматериал: Сыворотка крови	
	Метод: ИФА	

Комплексное обследование на паразитарные инвазии (13 параметров)

Показатель	Значение	Нормы
Ig G к цистицеркам свиного цепня <i>Taenia solium</i> (ИФА)	2,70 UE	<9,0 - отрицат., 9,0 -10,9-сомнит.(рекоменд. Повтор.анализа через 2-3 нед), > 11,0 - положит.

примечание	Нормы указаны согласно полу и возрасту
------------	--

Врач КДЛ: _____

ответственный исполнитель	
---------------------------	--